

말라리아 증상은?




우리나라에서 유행하는
삼일열말라리아는 오한, 고열,
발한 등 증상이 48시간 주기로
반복됩니다.

증상이 감기몸살과 비슷해
진단이 늦어질 수 있으므로
말라리아 의심증상이 나타나면
즉시 의료기관에 방문하여
위험지역 여행력 및 모기물림을
의료진에게 알리고 진료를
받으시길 바랍니다.

우리나라는 • • • • 말라리아 발생국가입니다!






국내 말라리아는 주로 **인천, 경기** 및
강원북부지역에서 **5월부터 10월 사이에**
환자가 많이 발생합니다.

말라리아는 모기에 물리지 않는 것이 최선의 예방법 입니다



말라리아란?



말라리아는 원충에 감염된 모기에 의해 발생하는 감염병으로, 말라리아를 일으키는 모기가 흡혈을 할 때 원충이 사람의 몸으로 들어와 감염됩니다.



말라리아 매개모기는 앓아있을 때 꼬지를 들고 있는 모습을 보이며, 비행 시 소리가 나지 않습니다.

또한 풀숲이나 축사 근처 등에 서식하고, 주로 일몰 후부터 일출 전 까지 활동합니다.



말라리아 예방수칙

1. 야간활동 자제



말라리아 매개모기는 야간에 활발하게 활동하므로 해질녘에서 새벽시간까지 야외 활동을 자제하세요.

2. 운동후엔 샤워



운동 시 땀으로 모기가 유인되므로 운동 후에는 반드시 샤워하세요.

3. 밝은색의 긴옷 착용



야간·야외 활동 시 밝은색의 긴옷을 입으세요.

4. 기피제 사용



상처나 얼굴주변을 피해 기피제를 사용하세요.

5. 모기 서식처 제거



주 1회 집 주변 모기 유충이 서식할 수 있는 인공용기, 웅덩이 등 고인 물을 제거하세요.

6. 방충망, 모기장, 살충제 사용



모기가 실내로 침입하지 못하도록 방충망 정비 및 모기장 사용을 권고하고 실내 살충제는 적절히 사용해주세요.